

Овод — заманчивая насадка. Он живуч на крючке и особенно хорош тем, что своими крылышками разводит на воде очень заметную мерцающую рябь. Если поблизости есть голавль, он обязательно соблазнится оводом. Одна беда — овода очень трудно достать. Правда, если жаркий день, в стаде коров их можно наловить предостаточно.

Слепни (в некоторых местах их называют пауты) достаточно известны. Многие рыболовы применяют их в качестве насадки, особенно при ужении нахлыстом. Личинок же и куколок этих насекомых почти не знают, а между тем на них отлично ловятся окунь, щука, ерш, лещ и другие рыбы.

Личинки слепня можно обнаружить в грунте мелководий, на болотах, в берегах озер и рек. Когда рыболов добывает личинок стрекоз, мотыля, ему могут попасться и личинки слепней. Размеры и окраска их варьируются в зависимости от видовой принадлежности.

Перед окукливанием длина тела может колебаться у разных видов от 15 до 40 мм, а цвет — от молочно-белого до желтовато-коричневого. Весьма характерно наличие на теле полупрозрачных личинок своеобразных утолщений - поясков. Отметим для сравнения, что опарыш, в общем-то близкий по внешним очертаниям мелким видам личинок слепней, таких утолщений не имеет. Кроме того, сегменты личинок слегшей суживаются к переднему и заднему концам.

Собирать личинок лучше в конце мая-июне, когда они достигают наиболее крупных размеров и концентрируются на поверхности грунта. Хранить их надо в деревянных ящиках, коробках или другой упаковке на небольшом количестве того грунта (субстрата), где их добыли. Следует иметь в виду, что при хранении возможны случаи каннибализма, поэтому желательно помещать личинок раздельно, хотя это, конечно, сопряжено с известными трудностями.