



Похож на большого кроншнепа, но значительно мельче, клюв короче и не так сильно изогнут, на груди черные сердцевидные пестрины. Хвост белый с поперечными пестринами. Одна из редчайших птиц мира. В последние десятилетия несколько десятков или сотен птиц зимуют в Марокко, но места гнездования неизвестны — видимо, это большие торфяные болота где-то в степи Западной Сибири или водоемы Заволжья. Голос как у большого кроншнепа, но несколько выше и короче.

Места обитания: Осоково-пушицевые и осоково-вейниковые заболоченные луга, перемежающиеся березово-осиновыми или лиственнично-березовыми лесами и колками по долинам рек и вокруг крупных колков, встречался на обширных торфяных болотах с зарослями тальника и березы. Общее распространение. Современная область гнездования не ясна. Достоверные находки гнезд или птенцов известны до 1924 г. на юге Западной Сибири из окрестностей г. Тара (Тарковский р-н Омская обл.) и на болотистых участках ленточных боров в окрестностях Барнаула. При обследовании всех вышеперечисленных мест в 1989-94 гг. птицы не были обнаружены. Встречи в гнездовой период взрослых и молодых птиц известны от Волжско-Уральского междуречья на западе до г. Томска на востоке и от г. Челябинска на севере до Прикаспийских степей на юге. На пролете в последние десятилетия встречается в Северном Прикаспии, Причерноморье, Западном и Южном Казахстане, на Балканском полуострове, в Средиземноморье, в том числе в Марокко и Тунисе.

Распространение в области. Приводимые в литературе данные о гнездовании тонкоклювого кроншнепа в прошлом в районе оз. Чаны, оз. Сартлан и ст. Озеро Карачи часто ставятся под сомнение, поскольку имеющиеся указания о нахождении гнезд и встречах в то время взрослых птиц не подтверждены коллекционными материалами или тщательным описанием условий нахождения гнезд. Молодая птица была добыта 13

июля 1899г. у р.ц. Коченево. На оз. Чаны молодой самец был добыт 21 июля. Последние находки птиц в гнездовой период на территории области были в 1976 г. - один кроншнеп встречен 28 мая у южного побережья оз. Чаны, и дважды - в мае 1976 и 1977 гг. - наблюдали кроншнепа, очень похожего на тонкоклювого, на острове Шульдиков (оз. Б. Чаны).

Места обитания. Все известные места гнездования в районе г. Тара были приурочены к торфяным болотам с гривами, поросшими тальником и невысокой березой. Гнезда здесь были устроены на сухих кочках. Под г. Барнаулом выводки находили на торфяном болоте на окраине соснового бора. В районе оз. Чаны гнездо, описанное как принадлежащее тонкоклювому кроншнепу, размещалось на солончаковом лугу. Численность и тенденции ее изменения. В конце XIX века тонкоклювый кроншнеп отмечался как редкий, местами обычный кулик, но уже тогда некоторые исследователи причисляли его к исчезающим. На зимовке в Марокко в январе 1964 г. зарегистрировано 800 тонкоклювых кроншнепов. Это максимальное количество особей, встреченных одновременно. Возможно, оно отражает численность всей популяции на тот период. Там же в 1975 г. учтено 123 птицы, а в 1994 г. было обнаружено только 2 птицы. В период с 1960 по 1980 гг. ежегодно отмечали в среднем 28 особей, абсолютное большинство из них находили вне пределов вероятной области гнездования. С 1980 г. на путях пролета и зимовках одновременно встречали не более 20 особей. Современная численность оценивается от 50 до 270 особей. На территории России с начала 70-х гг. тонкоклювого кроншнепа отмечали не более 10 раз.

Основные лимитирующие факторы. Катастрофическое снижение численности, вероятно, связано с сокращением пригодных местообитаний на местах размножения, а также на путях пролета и зимовках. Именно степные и лесостепные ландшафты на территории России, откуда в прошлом известна основная масса летних встреч тонкоклювого кроншнепа, претерпели наиболее значительные изменения за последние сто лет. На этом фоне интенсивная охота на путях пролета в Венгрии, Греции, Италии и некоторых других странах также могла сыграть существенное значение. Комплекс этих факторов, по-видимому, привел к изменению структуры популяций, а затем к дальнейшему снижению численности.

Особенности биологии и экологии. Данных очень мало. На места гнездования прилетает в первой половине мая. Гнездится отдельными парами или небольшими колониями - до 14 пар, иногда совместно с большим кроншнепом. Расстояние между гнездами в колонии под г. Тара составляло 2-15 м. К откладке яиц приступает в мае. Полная кладка содержит 4 яйца. Птенцы появляются во второй половине июня. Осенняя миграция на территории России и прилегающих регионах проходит с июля по сентябрь. Данные о питании на гнездовании отсутствуют. Есть наблюдения охоты за саранчовыми во время пролета в Казахстане. Разведение. Попыток разведения и содержания не предпринималось.