



гнездится в Калининградской области и Татарстане, обнаружена также в европейской части страны и на юге Западной Сибири. На пролете, гнездовании и зимовках населяет равнинные пойменные и заболоченные территории с густой травянистой растительностью, с уровнем воды, не превышающей 10 см.

От других камышевок вертялая отличается желтоватыми тонами оперения, хорошо заметными желтыми полосами посреди темени и над глазами. Эта небольшая и очень осторожная птица населяет европейские болота, поросшие густой осокой и травой с обязательно разбросанными среди них отдельными кустиками ивняка, на которых токуют самцы, отдыхают и осматривают гнездовой участок. Гнездится вертялая камышевка и на заливных кустарниково-осоковых лугах, по заросшим кустарником и осокой прудам, топким, зарастающим торфяным карьерам. Но всюду эта птица встречается спорадично, и, кроме некоторых болотистых районов Европы, нигде не бывает многочисленной. Максимальной численности достигает на болотах Северо-Европейской низменности. На территорию России её ареал вдаётся узким и острым клином, охватывая южную луговую зону хвойно-широколиственных лесов и достигая Урала. Зимует в Малой Азии, Египте, Греции, Северо-Западной Африке. Всюду перелетная птица.

На местах гнездовой появляется во второй половине апреля - в мае. Заселяя топкие, болотистые места, гнезда чаще строит на суше, у оснований густо заросших травой кустов ивняка. Позыв - отрывистое "ткк" или "таккк", сигнал максимальной тревоги - треск "тррр-тррр". Песня сходна с песней барсучка но поется торопливее, тише, отрывистее. Характерные трели короче. В песню часто вставляются особые слоги "эррр...диди-дя" или "ррр-дюдюю", по которым её легко отличить от других камышевок. Во время токового полета самец со щебетанием порхает над отдельными высокими травинками и кустиками ивы. Взрослые птицы очень осторожны и увидеть их трудно.

Молодые часто с любопытством рассматривают новые живые объекты и, перепархивая со стебля на стебель или с ветки на ветку, подбираются к человеку или к зверю почти вплотную.

Гнездо вертлявой камышевки полушаровидное, прочное, но неряшливое, обычно защемляется среди густых ветвей кустарника невысоко над землей. Края сплетаются с поддерживающими частями растений. Полная кладка из 5-6 зеленовато-желтых с бледно-оливковыми пятнами и крапинками яиц. После вылета выводки активно кочуют и появляются на картофельных полях, огородах, где их легко опознать по желтым полоскам на голове и характерным позывам. Экологически вертлявая камышевка представляет собой как бы предшествующую болотной или кустарниковой камышевке ступень, так как она, придерживаясь сильно увлажненных и топких мест, особенно тесно связана с осокой и кустарниковыми зарослями. Подобно болотной камышевке, гнездо строит на суше. Её можно было бы назвать осоковой камышевкой.

Питается членистоногими, их обилие привлекает камышевку в места гнездования. Вертлявая камышевка - дальний мигрант, она преодолевает на пролете в Западную Африку обширные территории Сахары.